

Culebra de collar (*Natrix astreptophora*)



Descripción

Culebra mediana, de hasta 1 m de longitud. Los juveniles (menores de 40 cm) tienen un collar amarillo o blanco muy contrastado detrás de la cabeza. Los individuos adultos tienen un color gris-verdoso y sin collar. El tipo de escamas que tiene le dan a esta culebra un aspecto mate. Su ojo naranja es inconfundible.

Hábitat

Al igual que la culebra viperina, la culebra de collar también está bastante ligada al agua. Vive cerca de ríos, arroyos y lagunas.

Alimentación

Su principal fuente de alimento son los anfibios; los individuos jóvenes se alimentan principalmente de ranas y los adultos de grandes sapos.

¿Con quién se confunde?

A veces los individuos que presentan collar pueden ser confundidos con juveniles de culebra de esculapio que también presentan una especie de collar detrás de la cabeza. En esta especie, sin embargo, el collar apenas contrasta con el resto del cuerpo y la coloración es marrón en lugar de gris-verdosa.

Peligrosidad

Completamente inofensiva. Nunca trata de morder, pero bufa, silba o golpea con la cabeza si se siente amenazada.



Amenazas y estado de conservación

Las principales amenazas de esta especie son los atropellos en carreteras y la persecución directa.

En el País Vasco no está amenazada.

¡Qué curioso! A veces, cuando se siente amenazada, se hace la muerta para que la dejemos tranquila. Se pone boca arriba, saca la lengua y vacía las glándulas cloacales, de manera que ¡buele muy mal!

